


Acanthodactylus erythrurus

Nederlandse naam: Roodstaartfranjeteeen-hagedis
Duitse naam: Gewöhnlicher Fransenfinger
Engelse naam: European Fringefinger



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Scincomorpha (skinkachtigen)
Familie: Lacertidae (echte hagedissen)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De roodstaartfranjeteeen-hagedis komt voor in op de zandige en rotsige streken van Noord-Afrika / Iberisch schiereiland en Zuid-Frankrijk

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotsterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

Temperatuur: 25 - 35 °C. (dagtemperatuur)
15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Een koele winterperiode (8 - 10 °C) van 4 tot 8 weken is sterk aan te raden. Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 - 6 stuks. Het vrouwtje houdt de steenrode onderkant van de staart.

Overige opmerkingen:

