

## Acanthosaura armata

**Nederlandse naam:** Stekelnekagame  
**Duitse naam:** Grosser Nackenstachler  
**Engelse naam:** Pricklenapes



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Iguania (leguaanachtigen)  
**Familie:** Agamidae (agamen)

**Lengte:** 20 tot 30 cm.

**Herkomst:** De stekelnekagame komt voor in de bergwouden van Zuid- China, Maleisië en Sumatra.

**Terrariumtype:** De stekelnekagamen vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

**Temperatuur:** 22 - 28 °C. (dagtemperatuur)  
20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Stekelnekagame eten kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren hebben geen waterbak nodig. Wel moeten ze elke dag worden besproeid met lauwwarm water. Eén keer per week moet aan het sproeiwater een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt tot 12 stuks. Mannetje wat groenige tinten.

**Overige opmerkingen:** Hoofdzakelijk een boombewoner; kan van kleur veranderen.

