


Acanthosaura crucigera

Nederlandse naam: Stekelnek-agaam
Duitse naam: Nackenstachler
Engelse naam: Pricklenape

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (Hagedissen)
Infraorde: Iguania (Leguaanachtigen)
Familie: Iguamidae (leguanen)
Onderfamilie: Agamidae (Agamen)



Lengte: Tot 21 cm.
Herkomst: De stekelnek-agaam komt voor in Zuidoost-Azië
Terrariumtype: De stekelnek-agamen vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.
Temperatuur: 22 tot 28 °C. (dagtemperatuur)
20 tot 25 °C. (nachttemperatuur)
Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').
Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als voor het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 6 tot 8 stuks.
Overige opmerkingen: Deze dieren zijn absoluut niet schuw. Ze zullen vaak de schaduw opzoeken.

