


## Anolis equestris

**Nederlandse naam:** Ridderanolis / reuzenanolis  
**Duitse naam:** Riesenanolis / Ritteranolis  
**Engelse naam:** Giant anole / knight anole



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Iguania (leguaanachtigen)  
**Familie:** Iguanidae (leguanen)  
**Onderfamilie:** Anolinae (anolissen)

**Lengte:** Tot 55 cm.

**Herkomst:** De ridderanolis/reuzenanolis komt voor in Cuba.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Alle soorten bladgroenten (andijvie) en zacht fruit. Ook bloemen (paardebloemen) kunnen worden aangeboden. Deze anolis lust ook iets grote prooidieren, zoals nestmuizen. Vooraf het voedsel bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Dagelijks moet er worden gesproeid. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. Handhaaf een hoge vochtigheidsgraad.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks. Het mannetje heeft een grotere keelzak.

**Overige opmerkingen:** Leeft eigenlijk in boomtoppen. Niet erg actief.

