

Anolis sagrei

Nederlandse naam: Sagra's anolis
Duitse naam: Bahamaanolis
Engelse naam: Brown anole



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Iguania (leguaanachtigen)
Familie: Iguanidae (leguanen)
Onderfamilie: Anolinae (anolissen)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De Sagra's anolis komt voor in Florida tot aan Centraal-Amerika, ook komen ze voor op veel Caribische eilanden.

Terrariumtype: De Sagra's anolissen vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet licht vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Enkele rotsen op de grond zijn nodig voor dit dier. Het brengt normaal gesproken veel tijd op de grond door.

Temperatuur: 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Dagelijks moet er worden gespreid. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. Handhaaf een redelijk hoge vochtigheidsgraad.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks. Het mannetje heeft een grotere keelzak.

Overige opmerkingen:

