


## Cnemidophorus lemniscatus

**Nederlandse naam:** Renhagedis  
**Duitse naam:** Rennechsen  
**Engelse naam:** Dotted racerunner



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (Hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (Hagedissen)  
**Infraorde:** Scincomorpha (Skinkachtigen)  
**Familie:** Teiidae (Tejuhagedissen)

**Lengte:** Tot 30 cm.

**Herkomst:** De renhagedis komt voor in op de open plekken van de regenwouden van Midden-Amerika (Honduras tot Guyana).

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)  
15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders, nestmuizen e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moet plaatselijk elke dag worden gesproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 4 tot 6 stuks.

**Overige opmerkingen:** De dieren zijn zeer snel en zijn in open ruimtes in staat zich op hun achterpoten voort te bewegen.

