

## Cnemidophorus murinus

**Nederlandse naam:** Renhagedis  
**Duitse naam:** Rennechsen  
**Engelse naam:** Whiptail lizard / racerunner



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (Hagedissen / slan  
**Suborde:** Sauria (Hagedissen)gen)  
**Infraorde:** Scincomorpha (Skinkachtigen)  
**Familie:** Teiidae (Tejuhagedissen)

**Lengte:** Tot 35 cm.

**Herkomst:** De renhagedis komt voor in Midden-Amerika (Bonaire & Curaçao).

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een droog terrarium met veel stronken en schors. De bodem bestaat uit grit of bark. Let op een goede bevestiging van het klimmateriaal. Schuilplaatsen zijn ook nodig.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Hoewel het een alleseter is, heeft dit dier een voorkeur voor vlees. Het normale voedselaanbod (wormsoorten, bijvoorbeeld meelwormen en moriowormen) moet worden aangevuld met bladgroenten als andijvie (goed wassen!). Ook rijst kan worden aangeboden. Zacht fruit kan eveneens worden gegeven. Voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moet plaatselijk elke dag worden gespreid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 4 tot 6 stuks.

**Overige opmerkingen:** De omschreven soort is typisch voor het eiland Bonaire. Het is onduidelijk welke familierelatie bestaat met andere renhagedissen.

