


Dasia smaragdina

Nederlandse naam: Smaragd(-boom-)skink
Duitse naam: Smaragdskink
Engelse naam: Emerald skink



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Scincomorpha (skinkachtigen)
Familie: Scincidae (skinken)
Onderfamilie: Lygosominae

Lengte: Tot 25 cm.

Herkomst: De smaragd(boom)skink komt voor in de Filippijnen, Zuidoost-Azië en Oceanië.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

Temperatuur: 25 - 28 °C. (dagtemperatuur) (plaatselijk 35°C.)
20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Naast de insecten kan ook zacht, zoet fruit en Phelsufood worden gegeven. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren hebben geen waterbak nodig. Wel moeten ze elke dag worden besproeid met lauwwarm water. Eén keer per week moet aan het sproeiwater een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 tot 6 stuks.

Overige opmerkingen:

