


## Emoia cyanura

**Nederlandse naam:** Blauwstaartskink  
**Duitse naam:** Blauschwanzskink  
**Engelse naam:** Blue-tailed slender skink



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (Hagedissen / slan  
**Suborde:** Sauria (Hagedissen)gen)  
**Infraorde:** Scincomorpha (Skinkachtigen)  
**Familie:** Scincidae (Skinken)  
**Onderfamilie:** (Skinkachtigen s.s.)

**Lengte:** 10 - 12 cm.

**Herkomst:** De blauwstaartskink komt voor in Zuidoost-Azië (vooral rond de kusten van veel eilanden in de Indische oceaan).

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 25 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Het zijn echte waterliefhebbers. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

**Overige opmerkingen:** Overdag actief.

