


Gerrhosaurus major

Nederlandse naam: Soedanese schildhagedis
Duitse naam: Braune Schildchse
Engelse naam: African plated lizard



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Scincomorpha (skinkachtigen)
Familie: Cordylidae (gordelstaarthagedissen)
Onderfamilie: Gerrhosaurinae (schildhagedissen)

Lengte: 40 - 60 cm.

Herkomst: De soedanese schildhagedis komt in de woestijn en savannegebieden van oostelijk Afrika voor.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een woestijnterrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in een grot.

Temperatuur: 30 - 40 °C. (dagtemperatuur)

18 - 22 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Zacht fruit en bladgroenten kunnen als aanvulling worden gegeven. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. en.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 tot 4 stuks. Om de dieren tot voortplanting te krijgen is een winterrust van 4 tot 6 weken in een donkere plaats essentieel. De temperatuur moet 15 tot 20 °C bedragen.

Overige opmerkingen:

