


## Holbrookia maculata

**Nederlandse naam:** Dove leguaan  
**Duitse naam:** Taubleguane  
**Engelse naam:** Lesser earless lizard



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Iguania (leguaanachtigen)  
**Familie:** Iguanidae (leguanen)  
**Onderfamilie:** Sceloporinae (stekelleguanen)

**Lengte:** Tot 19 cm.

**Herkomst:** De dove leguaan komt voor in de steppegebieden van westelijk Noord-Amerika.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rotsterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

**Temperatuur:** 30 - 40 °C. (dagtemperatuur)  
20 °C. (nachttemperatuur)  
Een winterperiode van 4 tot 6 weken bij een temperatuur van 10° C. is aan te bevelen.

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 tot 10 stuks.

**Overige opmerkingen:**

