

Hydrosaurus weberi

Nederlandse naam: Weber's waterleguaan / zeilagaam
Duitse naam: Webers segelechse
Engelse naam: Weber's sailing lizard



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (Hagedissen)
Infraorde: Iguania (Leguaanachtigen)
Familie: Agamidae (Agamen)

Lengte: Tot 100 cm.

Herkomst: De weber's waterleguaan of zeilagaam komt voor in Zuidoost-Azië, vooral op de kleinere eilanden van de Molukse achipel.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk. Klimgelegenheid is zeker nodig.

Temperatuur: 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

20 - 25 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Hoewel het een alleseter is, heeft dit dier een voorkeur voor vlees. Het normale voedselaanbod (grotere insecten, nestmuizen, wormen) moet worden aangevuld met bladgroenten als andijvie (goed wassen!). Ook bloemen (paardebloemen) kunnen worden aangeboden. Zacht fruit kan eveneens worden gegeven. Voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak, waar ze eventueel zelf in passen! Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 10 - 20 stuks. Heeft hoge huidkam op het eerste deel van de staart.

Overige opmerkingen:

