

Latastia longicauda

Nederlandse naam: Langstaartrenhagedis

Duitse naam: -

Engelse naam: -

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia


Onderklasse: Lepidosauria

Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)

Suborde: Sauria (Hagedissen)

Infraorde: Scincomorpha (skinkachtigen)

Familie: Lacertidae (Echte hagedissen)



Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: Noordoost-Afrika (van de Sinai tot Senegal en Somalië) en West-Azië (Arabisch schiereiland).

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotsterrarium. Naast veel grondoppervlak en een diepe bodemlaag (zand) moeten ze ook wat klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden, behalve in de schuilplaatsen. Deze moeten wat vochtig zijn.

Temperatuur: 25 tot 35 °C. (dagtemperatuur)

15 tot 20 °C. (nachttemperatuur)

Een winterperiode van 4 tot 8 weken bij temperaturen tussen 8 en 10 °C. is aan te bevelen.

Voedsel: Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt meestal 2 tot 6 stuks.

Overige opmerkingen: Typische groundbewoners die graag graven en de nacht en de warmste uren doorbrengen in hun schuilplaatsen. Er zijn ongeveer 7 ondersoorten te onderscheiden.

