


Lygosoma variegata

Nederlandse naam: Bosskink / bodemskink
Duitse naam: Schlankskink
Engelse naam: lygosomine skink

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (Hagedissen)
Infraorde: Scincomorpha (Skinkachtigen)
Familie: Scincidae (Skinken)
Onderfamilie: Lygosominae



Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: Zuidoost- Azië.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. De dieren hebben schuilplaatsen nodig.

Temperatuur: 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen. Buffalo- en meelwormen kunnen beter niet worden gevoerd. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als voor het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

Overige opmerkingen: De dieren graven eventueel zelf een schuilplaats. Ze zijn erg schuw en verbergen zich.

