

## Ptychozoon lionotum

**Nederlandse naam:** Vliegende gekko  
**Duitse naam:** Faltengecko  
**Engelse naam:** Flying gecko



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Gekkota (gekkoachtigen)  
**Familie:** Gekkonidae (gekko's)

**Lengte:** Tot 15 cm.

**Herkomst:** Regenwouden van Birma en Thailand.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. De dieren zijn boombewoners; goede klimtakken en boomschors aan te bevelen.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)  
ca. 22 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Insecten. Sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voederdieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** de dieren vragen een waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** de dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

**Overige opmerkingen:** Vooral 's nachts actieve boombewoner. Dankt zijn naam aan de huidplooi aan de zijkant van het lichaam waarmee een val kan worden opgevangen.

