


## Sauromalus obesus

**Nederlandse naam:** Chuckwalla  
**Duitse naam:** Chuckwalla  
**Engelse naam:** Chuckwalla



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Iguania (leguaanachtigen)  
**Familie:** Iguanidae (leguanen)  
**Onderfamilie:** Iguaninae (leguanen s.s.)

**Lengte:** Tot 45 cm.

**Herkomst:** Halfwoestijnen en steppen in het zuidwesten van Noord-Amerika en Noord-Mexico.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een woestijn-/steppen terrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in een grot.

**Temperatuur:** 30 - 35 °C. (dagtemperatuur) Plaatselijk 40°C.

20° C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Alle soorten bladgroenten (andijvie) en zacht fruit. Ook bloemen (paardenbloemen) kunnen worden aangeboden. Vetplanten lusten ze eveneens. Vooraf het voedsel bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** de dieren vragen hooguit een kleine waterbak; ze kunnen ook zonder. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** de dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt tot maximaal 20 stuks.

**Overige opmerkingen:** De chuckwalla verankert zich bij gevaar door zich op te blazen en schrap te zetten in rotsspleten. Vooral 's nachts actief. Nooit meerdere mannetjes bij elkaar zetten. Het geslachtsonderscheid: vooral in de paartijd, maar ook daarbuiten heeft de man felle kleuren. De vrouwtjes hebben net als jonge dieren ringen om hun staart.

