


## Sceloporus poinsetti

**Nederlandse naam:** Spleetstekelleguaan  
**Duitse naam:** Stachelleguane  
**Engelse naam:** Crevice spiny lizard



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Lepidosauria  
**Orde:** Squamata (hagedissen / slangen)  
**Suborde:** Sauria (hagedissen)  
**Infraorde:** Iguania (leguaanachtigen)  
**Familie:** Iguanidae (leguanen)  
**Onderfamilie:** Sceloporinae (stekelleguanen)

**Lengte:** Tot 30 cm.

**Herkomst:** Droge berggebieden (tot 2500 m) in het zuidwesten van de V.S. en Noord-Mexico.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rotsterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

**Temperatuur:** 30 - 40 °C. (dagtemperatuur) Liefst boven de 37° graden plaatselijk in verband met het op gang komen van de spijsvertering.

20 °C. (nachttemperatuur)

Een winterperiode van 4 tot 6 weken bij een temperatuur van 10° C. is aan te bevelen.

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Eet af en toe ook bloemen.

**Water:** De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden verversd. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. Af en toe 's avonds licht sproeien.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend/levendbarend (ovovivipaar). Tijdens of direct na het leggen komen de jongen uit het ei. Het aantal jongen per legsel bedraagt 5 tot 16 stuks.

**Overige opmerkingen:**

