

Tiliqua scincoides gigas

Nederlandse naam: Reuzenblauwtongskink
Duitse naam: Gewöhnliche Blauzunge
Engelse naam: Giant blue-tongued Skink



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Scincomorpha (skinkachtigen)
Familie: Scincidae (skinken)
Onderfamilie: Tiliquinae (reuzenskinken)

Lengte: Tot meer dan 50 cm.

Herkomst: Droge gebieden en savanneachtige streken in Indonesië en de Molukken.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een groot, droog terrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben. Deze mag wat vochtig zijn.

Temperatuur: 28 - 32 °C. (dagtemperatuur) (plaatselijk 40 °C)
18 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Deze alleseter heeft een voorkeur voor plantaardig voedsel. Allerlei soorten bladgroenten en zacht fruit kunnen dagelijks worden aangeboden. Het voedsel moet vooraf grondig worden gewassen. Ze lusten ook Phelsofood. Van tijd tot tijd (vooral bij jongere dieren en drachtige vrouwtjes) kan dierlijk voedsel in de vorm van krekels, sprinkhanen, kleine stukjes vlees worden aangeboden. Voedsel bestrooien met calciumpoeder met fosfor.

Water: De dieren vragen een grote waterschaal, waar ze ook in kunnen baden. Dagelijks moet het water worden verversd. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend/levendbarend (ovovivipaar). Direct na of tijdens het leggen van de eieren komen de jongen uit het ei. Het aantal jongen per legsel bedraagt 6 tot 10 stuks.

Overige opmerkingen:

