

**Latijnse naam:** *Brachypelma albopilosum*  
**Nederlandse naam:** Krulhaar-vogelspin  
**Duitse naam:** Kraushaar Vogelspinne  
**Engelse naam:** Curly hair

## Wetgeving

Alle soorten CITES B.

Dit geslacht bevat 14 soorten, waaronder de populairste vogelspinnen. De naam *Brachypelma* wordt vaak (foutief) als synoniem voor *Euthlus* gezien. Veel soorten (zeker *B. smithi*) werden met massa's tegelijk gevangen en geëxporteerd naar de Verenigde Staten en Europa. Alle soorten staan daarom nu op de CITES-lijsten. Veel *Brachypelma*'s zijn rustige spinnen die gemakkelijk te hanteren zijn. Het zijn echter bombardeerspinnen.

## Uiterlijk

Deze tot 8 cm grote spin heeft een zwartbruine basiskleur met goudkleurige, gekrulde haren op de poten en achterlijf en een gouden glans op het kopborststuk. De *B. albopilosum* is zeer rustig.

## Verspreidingsgebied

Van Guatemala tot Costa Rica in vochtige wouden.

## Huisvesting

De terrarium grote voor bodembewoners van 6 tot 8 cm bedraagt min. 30 x 15 x 15 cm. Maak schuilplaatsen met stenen, kurkschors, halve bloempotten of stukken hout. Zorg er wel voor dat een spin niet onder een steen kan graven zodat de ze niet geplet wordt of verwond raakt. De spinnen kunnen soms gaan klimmen en zich beschadigen door op een stekelige plant (cactus) of een scherp voorwerp (lavasteen) te vallen. Verwarm overdag met een lampje tot 24 à 27°C, zorg 's nachts voor 20°C (niet lager dan 15°C). Plaats geen bodemverwarming, dit is onnatuurlijk en droogt de bodem te snel uit. Plaats een waterbak en ververs het water regelmatig. Zorg voor 60-85% RV (bodembewoners het vochtigst). Sproei regelmatig een gedeelte van het terrarium, voor een bodembewoner bv. eens per week. Sproei nooit op het web of op de spin zelf! Maak de bodem 5 à 10 cm dik zodat de spin voldoende diep kan graven voor een hol, houd de bodem licht vochtig. Wat decoratie betreft kan je een plastic of stoffen plantje en een achterwand van kurk gebruiken, deze zijn echter niet noodzakelijk maar het oog wil ook wat.

## Hanteren

Hoewel sommige spinnen best vastgepakt zouden kunnen worden, is het beter een bakje over de spin te zetten en het dekseltje eronder te schuiven.

## Voedsel

In terraria komen vooral insecten in aanmerking, maar ook nestratten en jonge muizen voor grote soorten.

Stukjes runderhart en kipfilet, die met een pincet worden bewogen, worden soms ook gepakt. Variatie is iets minder belangrijk dan bij reptielen en amfibieën, zolang niet maanden achtereen uitsluitend meelwormen worden gevoerd.

Voer een spin regelmatig en met mate, ongeveer één tot drie prooien per week.

Spinnen eten enkele dagen/weken voor en na een vervelling niet.

Veel voedseldieren kunnen een vervellende spin storen of beschadigen.

Voer dus een dikke of doffe spin hooguit één prooi.

Zorg dat alle krekels uit het terrarium verwijderbaar zijn en niet massaal achter een achterwand kunnen kruipen.

Na of tijdens de paring worden mannetjes soms door vrouwtjes opgegeten, een welkome eiwitbron voor de productie van het nageslacht.

Spinnen vangen hun prooi meestal met vangwebben of door zich bliksemsnel op de prooi te storten.

Tegenstribbelende prooien worden met meerdere poten vastgehouden.

De kaken worden naar binnen gestoken, waarna de spin enzymen in de prooi spuit.

De kauwende kaken mengen de enzymen met de prooi, zodat deze oplost.

Door het zeer dunne verteringskanaal kan een spin alleen vloeibaar voedsel opzuigen.

Niet verteerbare resten (b.v. een chitinepantser) worden door de spin uit zijn leefomgeving verwijderd en in een hoek van het terrarium gelegd.

Prooien die niet meteen worden opgegeten, worden ingesponnen.

## **Voortplanting**

Volwassen mannelijke spinnen hebben maar een doel: het bevruchten van vrouwtjes. Ze kunnen echter pas paren nadat zij de bulbussen met sperma hebben gevuld. Dit gebeurt een week tot enkele maanden na de laatste vervelling. Daarna gaan zij actief op zoek naar een vrouwtje. Tijdens de paring leegt het mannetje de bulbussen in haar geslachtsopening, aan de onderzijde van haar achterlijf. Volwassen mannetjes leven maar kort. Enige tijd na de paring spint het vrouwtje een wit zakje en legt daarin de eieren. Deze eicocon wordt door het vrouwtje meegedragen of bewaakt in haar 'territorium', totdat de jonge spinnen uit de cocon kruipen.

## **Kleurvormen**

Kleur: Kopborststuk (cephalothorax) donkerbruin met een rode gloed. Een lichtgekleurde rand is altijd aanwezig om het rugschild (carapax). Achterlijf (abdomen) donkerbruin gekleurd met lange, lichter gekleurde haren. De poten hebben dezelfde basiskleur met lange haren. Lichte lengtestrepen zijn op de poten zichtbaar. Op de voorpoten zijn de strepen duidelijker dan op de achterpoten.

## **Ziektes**

Spinnen die niet meer willen eten en mager zijn, kunnen te droog of te koud zitten of een infectie hebben.

Voedselweigeraars zijn een enkele keer geneigd een kleinere spin, b.v. een bastaardvogelspin,

wel te eten.

Daarna worden ook 'gewone' voedseldieren weer geaccepteerd.

Oude of zieke spinnen worden vaak zwak, bewegen weinig en weigeren voedsel.

Het achterlijf vertoont rimpels.

Een slechte vervelling kan veroorzaakt zijn door een te droog terrarium.

Maak de oude resten vel vochtig met wattenstaafjes en probeer deze dan met pincetten van de spin te verwijderen.

Als dit niet lukt én als de spin niet meer kan eten, is het dier meestal ten dode opgeschreven.

Een te vochtig terrarium met slechte ventilatie bevordert schimmelgroei.

Dit is zichtbaar als steeds groter wordende witte of grijze vlekken op de spin.

Sterk aangetaste spinnen vertonen apathisch gedrag of zijn inactief.

Zet aangetaste dieren in een nieuw ingericht terrarium met voldoende ventilatie.

Vaak begint de muffe ruikende schimmel al op de bodem te groeien.

Zet ook dan de spin over in een ander terrarium.

Blijvende schimmelplekken zijn met een benomyloplossing (tuincentrum) te behandelen.

Er mag geen insecticide aan dit schimmelmiddel zijn toegevoegd.

Met name wildvangdieren worden vaak door mijten belaagd.

Mijten zuigen lichaamssap op en doden uiteindelijk de spin.

Verwijder de mijten zo goed mogelijk met een watten staaf, gedoopt in 70% alcohol, alvorens de spin in een schoon terrarium te zetten.

Het schoonhouden van het terrarium voorkomt al veel problemen.

Ook te veel vocht bevordert een mijten plaag.

De roofmijt *Hypoaspis miles* kan ter bestrijding worden ingezet.

Mijten tussen de kaken zijn vaak onschadelijke mee-etters die de kaken zelfs schoonhouden.

Gebroken ledematen geven problemen bij een volgende vervelling.

Pak met een pincet, waarvan de uiteinden met een stukje aquariumluchtslang zijn bedekt, de femur van de aangetaste poot en druk hard.

Dankzij een breukvlak in de coxa kan de spin de poot loslaten.

De wond die nu ontstaat, zit in vrijwel alle gevallen binnen enkele uren dicht.

Een dik achterlijf van bijvoorbeeld een grote vogelspin kan openscheuren als het van 30 cm hoogte of meer op een harde ondergrond valt.

Kleine scheuren kunnen met vaseline behandeld worden.

Leg bij grotere scheuren de spin in een diepvries om verder lijden te voorkomen.

Spinnen die te koud en te nat, of te warm en te droog worden gehouden reageren lusteloos of juist apathisch.

Ook insecten- en spinnenverdelgingsmiddelen (b.v. vlooienband) en reinigingsmiddelen kunnen een schadelijke uitwerking op spinnen hebben.

Pas bij aanschaf op dat u geen (volwassen) mannetje koopt als u dat niet speciaal wilt (zie 'geslachtsonderscheid')

Oude vrouwtjes zijn vaak erg groot, maar leven nog maar enkele jaren.

Dieren met gerimpelde achterlijven leven meestal nog maar kort.

Er mogen geen onregelmatige vlekken, bobbelen of blaasjes op het achterlijf zitten.

De kaken moeten intact zijn.

Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier.

Alle mogelijke ziektes in deze brief schrijven is onmogelijk.

Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op, misschien kunnen wij u helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die gespecialiseerd is in het behandelen van reptielen en amfibieën.

Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:

Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier)

Moeilijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties.  
Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting.  
Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële ontsteking

Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel

Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze diertjes voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden worden.

(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw huisdier ander gedrag vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en u eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

