


# Kaloula pulchra

**Nederlandse naam:** Indische stierkikker  
**Duitse naam:** Indischer Ochsenfrosch  
**Engelse naam:** Indian bullfrog / Malayan narrow-mouthed toad



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Amphibia  
**Onderklasse:** Anuromorpha (kikvorsen)  
**Orde:** Anura (Salientia) (kikkers en padden)  
**Suborde:** Diplasiocoela  
**Familie:** Microhylidae (smalbekkikkers)  
**Onderfamilie:** Microhylinae (smalbekkikkers s.s.)

**Lengte:** Tot 7,5 cm.

**Herkomst:** De Indische stierkikker komt voor in Zuidoost-Azië

**Terrariumtype:** Voor deze soort moeten twee terrariatypes worden aangehouden. Er moet een dikke bodemlaag worden gebruikt waarin de dieren eventueel kunnen graven. Ook moet voor voldoende schuilgelegenheid in de vorm van stronken worden gezorgd. Een deel van het jaar moet de bak vrij droog worden gehouden. De andere helft moet de bodemlaag redelijk vochtig zijn en kan een waterpartij (grote bak) worden toegevoegd.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C.

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moet de bodem in de natte periode regelmatig worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat toegevoegd worden.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Aantal eieren: tot 300 stuks.

**Overige opmerkingen:** De dieren zijn vooral 's nachts actief. Het zijn gulzige eters. De kweek is vrij simpel.

