

## Phyllomedusa hypochondrialis

**Nederlandse naam:** Zuid-Amerikaanse makikikker  
**Duitse naam:** Südamerikanischer greiffrosch / makifrosch  
**Engelse naam:** Grasping frog / monkey-frog



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Amphibia  
**Onderklasse:** Anuromorpha (kikvorsachtigen)  
**Orde:** Anura (Salientia) (kikkers en padden)  
**Suborde:** Procoela  
**Infraorde:** -  
**Familie:** Hylidae (boomkikkers)

**Lengte:** Tot 6 cm.

**Herkomst:** Brazilië.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

**Temperatuur:** 23 - 27 °C. (dagtemperatuur)



20 - 25 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen kunnen worden gevoerd. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren hebben een grote waterbak nodig. Ook moeten ze elke dag worden besproeid met lauwwarm water. Eén keer per week moet aan het sproeiwater een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele tientallen.

**Overige opmerkingen:** Een dier dat pas 's nachts tot leven komt en overdag verborgen leeft.



**Tro**