


Lampropeltis getulus getulus

Nederlandse naam: Oostelijke koningsslang / kettingslang
Duitse naam: Kettennatter
Engelse naam: Eastern kingsnake



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Serpentes (slangen)
Infraorde: Caenophidia
Familie: Colubridae (ringslangachtigen)
Onderfamilie: Colubrinae

Lengte: Tot ca 150 cm.

Herkomst: Ten oosten van de Rocky mountains in Noord-Amerika.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

Temperatuur: 25 - 35 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Dit dier eet levende warmbloedige dieren: muizen, ratten, hamsters, cavia's, gerbils of kleine (loop-)vogels kunnen worden aangeboden. Daarnaast allerlei amfibieën en reptielen. Calcium of vitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. De grootte van het prooidier: houd 1½ keer de bekbreedte aan.

Water: De dieren vragen een grote waterbak, ook om daarin te kunnen baden. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 6 tot 25 stuks.

Overige opmerkingen: Vooral in de schemering en 's nachts actief. Staat bekend als verdeler van gifslangen. Om de dieren tot voortplanting te brengen moeten ze vooraf gedurende een periode van ca. 8 weken op een temperatuur tussen 10 en 15 °C worden gehouden met dagelijks een kortere lichtperiode.

