


Thamnophis Radix

Nederlandse naam: Geblokte Kousebandslang
Duitse naam: Strumpfbandnatter
Engelse naam: Checkered Garter Snake



Plaats in het dierenrijk:
Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Serpentes (slangen)
Infraorde: Caenophidia
Familie: Colubridae (ringslangachtigen)

Lengte: 100 cm.

Herkomst: Midden-Amerika: het zuidwesten van de V.S. tot in Costa Rica.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een gematigd vochtig, wat hoger terrarium met veel klimtakken, stronken en schors. De bodem kan het best bestaan uit bark. Let op een goede bevestiging van het klimmateriaal.

Temperatuur: 20 - 30 °C. (dagtemperatuur)


15 - 25 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Deze dieren eten voornamelijk vis. Als variatie kunnen ook regenwormen worden gegeven. Vang deze niet in de buurt van een mesthoop. Calcium of vitamines hoeven bij levende prooidieren niet te worden bijgevoerd. Bij gebruik van diepvriesvis kan eens per week vitamine aan het water worden toegevoegd.

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water.

Voortplanting: De dieren zijn levendbarend (vivipaar). Het aantal jongen per legsel bedraagt 3 - 25 stuks.

Overige opmerkingen: Zeer sterk dier met groot aanpassingsvermogen. Plant zich zeer snel voort.



Sub

