

# Theraphosa leblondi

**Nederlandse naam:** Leblondi  
**Duitse naam:** -  
**Engelse naam:** Goliath bird-eating spider



**Plaats in het dierenrijk:**

**Stam:** Arthropoda (geleedpotigen)  
**Onderstam:** Chelicerata (chelicerendragers)  
**Klasse:** Arachnidae (spinachtigen)  
**Orde:** Araneae (echte spinnen)  
**Suborde:** Orthognatha (vogelspinachtigen)  
**Familie:** Theraphosidae (echte vogelspinnen)  
**Onderfamilie:** Theraphosinae

**Lengte:** Tot maximaal 12 cm (grootste spin ter wereld: spanwijdte van de poten tot 30 cm).

**Herkomst:** Frans Guyana, Brazilië.

**Terrariumtype:** De bakgrootte dient minimaal 50 x 50 x 50 cm te zijn voor een volwassen spin. De bodemgrond kan bestaan uit een mengsel van 50% potgrond (of turfmoelm) en 50 % zand. Een dikke laag van minimaal 10 cm is aan te bevelen, omdat de spin zich graag ingraaft. Van stenen en/of schors kan ook een schuilgelegenheid worden gebouwd. Planten kunnen worden toegevoegd, maar gebruik in geen geval cactussen.

**Temperatuur:** ca. 25 - 26°C. (dagtemperatuur)

ca. 18 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Grotere insecten kunnen als levend voer worden aangeboden. Ook (levende) muizen worden geaccepteerd. Verwijder niet genuttigde voedseldieren na een dag. Spinnen die op het punt staan te vervellen moeten niet worden gevoerd. De voedseldieren kunnen de spin direct na de vervelling aanvreten. De spin vervelt binnen 1 à 2 weken als het achterlijf van kleur verandert (van bruin/beige naar blauw zwart).

**Water:** De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Ook dagelijks sproeien (niet op de spin). De bak moet vochtig blijven. Een vochtigheidsgraad van 85 tot 95 % is aan te bevelen. Te droge lucht kan problemen geven bij de vervelling. Wel zéér goed ventileren.

**Voortplanting:** De eieren (100 tot 1000) worden gelegd in een cocon.

**Overige opmerkingen:** Bombardeerspin: de afgeworpen brandharen van het achterlijf kunnen de huid en slijmvliezen flink irriteren.

